

Higiene ambiental y desinfección totalmente efectiva con el coronavirus

Limpiar y desinfectar en un solo paso con SoChlor DST




**1**  
Use guantes y bata desechable. Si existe riesgo de salpicaduras, use protección para los ojos.



**2**  
Elimine cualquier contaminación importante antes de aplicar SoChlor, incluyendo orina y vómito.



**3**  
Disuelva las tabletas de SoChlor (de acuerdo con las instrucciones de dilución) en agua. Si la solución es anterior a 24 horas, haga una nueva solución.



**4**  
Utilice la solución de acuerdo con la política de su hospital.



**5**  
Deseche la solución restante en la esclusa o drene con agua corriente.



**6**  
Lávese las manos después de quitarse los guantes.

## Instrucciones de dilución

Tasas de dilución para SoChlor DST por 1 litro de agua

Situación ambiental	Cantidad SoChlor requerida	SoChlor DST / 1,7 g NaDCC Tableta (MFB256 / MFB294)
Desinfección estándar y limpieza (bacterias)	1,000 ppm	1
Desinfección de brotes para matar virus y esporas	5,000 ppm	5
Desinfección posterior al derrame para matar la sangre y la tuberculosis	10,000 ppm	10

## Advertencias y precauciones



- Causa irritación ocular grave.
- Puede causar irritación respiratoria.
- Muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos.
- El contacto con ácidos libera gas tóxico.
- Use solo puertas o en un área bien ventilada.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Use protección para los ojos.
- Si persiste la irritación ocular: Obtenga asesoramiento / atención médica.
- Recoger el derrame.
- Guardar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- Deseche el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales.



Contiene: Troclosene Sodium, Sodium Toulene Sulphonate, Sodium N-Lauroylsarcosinate.